



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Imperator rhodopurpureus (Smotl.) Assyov et coll.

Synonyme : *Boletus rhodopurpureus*, *B. rhodopurpureus f. polypurpureus*

Noms français : Bolet rouge pourpre, Bolet vieux rose

Surtout sous chênes. Chapeau cabossé grumeleux, vieux rose, terni de rougeâtre brunâtre ou crème avec l'âge (parfois pourpre sombre et pores rouge sang, autrefois distingué sous la *f. polypurpureus*, cf. page 2). Pores jaunes puis orangé rouge, restant longtemps jaunes vers la marge, bleuissants au toucher. Stipe jaune à base plus rouge, couvert d'un fin réseau concolore ou rouge. Chair vivement bleuissante à la coupe. Spores 10,5-15 x 4,5-6 µm. A comparer avec :

- *I. rhodopurpureus f. xanthopurpureus* : totalement jaune ;
- *I. luteocupreus* : chapeau non ou peu cabossé rosâtre cuivré, pores rouge carmin vif, réseau du stipe plus vivement coloré et en relief ;
- *I. torosus* : chapeau non cabossé rapidement gris olivâtre teinté de brun vineux, pores jaunes mais parfois orangés, stipe jaune avec un réseau concolore.

Ce bolet fait rarement défaut chaque année, parfois en assez grand nombre selon la pluviométrie, entre juillet et novembre. Il semble possible de l'observer un peu partout dans la région.

Biblio : littérature courante.











