



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Rhodophana nitellina (Fr.) Papetti

Synonymes : *Rhodocybe nitellina*, *Clitopilus nitellinus*

Nom français : Rhodocybe cuivré

En forêt, dans les endroits riches en humus. Chapeau 1-7 cm, hygrophane, roux orangé à ochracé. Lames crème pâle à beige orangé. Stipe concolore au chapeau. Odeur et saveur très farineuses. Spores 7-9 x 4,5-5,5 µm, bosselées. Basides tétrasporiques. Cystides absentes.

Des études biomoléculaires démontrent aujourd'hui que sous ce binôme, se cache en réalité un complexe d'espèces dont les limites ne sont pas aisées à cerner. En l'état actuel des connaissances, la récolte présentée semble pouvoir être rattachée à *R. nitellina* var. *minor*, cf. par exemple Errotari 2020 p. 232 & 234, variété nettement plus petite que le type (1-1,5 cm), de forme marasmioïde à mycenoïde, avec un chapeau aux couleurs plus vives et la marge souvent striée par temps humide. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette fiche à l'occasion de nouvelles publications qui nous parviendraient.

Cet unique exemplaire a été récolté dans un bois de conifères à Brigueuil en octobre 2019, le chapeau atteignait 1 cm, les spores contrôlées mesuraient 7-8 x 3,5-4 µm.

Biblio : littérature courante.