



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pezizaceae*

Paragalactinia succosella (Le Gal & Romagnesi) Van Vooren

Synonyme : *Peziza succosella*

Sur sol, parfois sur lieux brûlés. Hyménium brun olive, brun-gris à brun-noir avec des tonalités rougeâtres. Chair exsudant un lait jaune. Spores 15-18 x 9-10 µm ornées de verrues irrégulières et grossières, généralement avec une guttule centrale. Base des asques sans crochets.

A comparer avec les autres pézizes à lait jaune :

- *P. michelii* et *P. berthetiana* : teintes différentes, rougeâtre, lilas, vineux...;
- *P. succosa* : hyménium souvent plus clair, spores plus grandes avec deux guttules et des verrues plus fortement allongées ;
- *P. infusca* : hyménium brun rougeâtre à brun foncé noirâtre, spores 16-18 x 9-10 µm avec des petites verrues et deux guttules.

Pézize visible presque chaque hiver entre novembre et février (une récolte en avril), aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. Elle reste néanmoins peu fréquente et seul un contrôle microscopique peut confirmer l'espèce. Malgré tout, les teintes sombres de l'hyménium peuvent déjà faire envisager ce binôme sur le terrain car son sosie, *P. succosa*, présente des teintes générales bien plus claires et semblerait être plus présent l'été et l'automne.

Biblio : Icône Boudier 277 - Ascomiceti Italia Medardi - Clé des discomycètes carbonicoles par R. Dougoud - Clé sur le genre *Peziza* de Hohmeyer et Häffner - Ascomycete.org 14(3).

Fiche réalisée en mai 2026 par Patrice TANCHAUD

Ste Gemme, nov. 2013



