



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pezizaceae*

Phylloscypha cf. labessiana (Boudier) Van Vooren, T. Richter & M. Vega

Synonyme : *Peziza labessiana*

Généralement sur sol sablonneux. Apothécies 7-35 mm, cupuliformes. Hyménium brun rougeâtre purpurin sombre, face externe et marge concolores avec des pustules brun-noir. Spores 14-16(17) x 8,5-9(10) µm, avec deux guttules (amas de granules polaires), ornées de verruces arrondies et isolées pouvant être plus denses aux pôles (donnant un aspect de pseudoapicules). Asques avec crochet à la base. Paraphyses avec un contenu hyalin ou brunâtre. A comparer avec :

- *P. boltonii* : véritable sosie fréquent sur notre littoral, hyménium souvent plus pâle, spores 15,5-20 x 7,5-9,5 µm ornées de verruces plus ou moins étirées pouvant être coalescentes ;
- *P. coquandii* : espèce montagnarde, hyménium jaunâtre rosé à rose orangé.

Nous avons deux récoltes, initialement nommées *Peziza cf. boltonii*, que nous rapprochons maintenant de ce binôme, notamment au vu de la publication dans *Ascomycete.org*, 13(3) :

- ci-dessus à gauche : décembre 2012 sur un mur en pierres commune de Nieulle sur Seudre ;
- ci-dessus à droite et page 2 : avril 2018 en forêt de La Coubre.

Biblio : Clé sur le genre *Peziza* de Hohmeyer et Häffner - *Ascomycete.org*, 13(3).

