



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pezizaceae*

Phylloscypha boltonii (Quélet) Van Vooren & Hairaud

Synonyme : *Peziza boltonii*

Au sol, souvent sur le littoral. Apothécies jusqu'à 5 cm. Hyménium brun violacé rougeâtre, excipulum avec des granulations violet-noir plus ou moins prononcées. Spores 15,5-20 x 7,5-9,5 µm avec 2 guttules, couvertes de petites verrues anguleuses ou étirées, avec parfois des amas de granules polaires denses.

A comparer avec :

- *P. labessiana* : spores 14-17 x 8,5-9,5 ornées de verrues arrondies et isolées, avec des amas de granules polaires donnant l'aspect de 2 guttules ;
- *Malvipezia pauli* : moins cupulé, spores ressemblantes de taille légèrement inférieure.

Avec une face externe également granuleuse, penser à *Iodowynnea auriformis* qui se distingue par des spores plus petites, brunâtres à maturité, comportant deux petites guttules et surtout ornées de trois ou quatre rangées de verrues coalescentes.

Cette pézize n'est pas rare sur l'ensemble du littoral, parfois aussi sur places à feu, elle semble surtout visible de la fin de l'automne au début de printemps.

Biblio : Ascomiceti d'Italia G. Medardi - Funghi di ambienti dunali G. Monti, M. Marchetti, L. Gorreri, P. Franchi - Clé des discomycètes carbonicoles par René Dougoud - Clé sur le genre *Peziza* de Hohmeyer et Häffner - Ascomycete.org, 13(3).











