



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

## *Ascorhizoctonia praecox* Chin S. Yang & Korf

Synonyme : *Tricharina praecox*

Dans les milieux incendiés. Apothécies 2-5 mm, sessiles, légèrement enfoncées dans le substrat. Hyménium grisâtre ochracé, puis brun jaunâtre à orangé olivâtre. Face externe concolore couverte de poils courts. Marge plus sombre par la présence de nombreux poils brun pâle mesurant jusqu'à 340 µm. Spores (12)14-18 x (8)9-12 µm, non guttulées, contenant quelques granulations aux extrémités. Paraphyses à contenu jaunâtre.

A comparer avec *Tricharina gilva* (véritable sosie et souvent confondu), poussant sur sol, très rarement sur (vieilles) places à feu, à hyménium moins orangé jaunâtre, poils ne dépassant pas 300 µm et paraphyses sans contenu jaune.

C'est l'automne et l'hiver que nous avons rencontré cet ascomycète à quelques reprises, typiquement dans son écologie, dans plusieurs secteurs de Charente-Maritime, par exemple à Plassay, St Sornin...

Biblio : Ascomiceti d'Italia G. Medardi - Clé des discomycètes carbonicoles R. Dougoud -Mycotaxon vol. 24 (1985). Boudier icône 349 - Discomycètes de France Grelet - Nordic Macromycètes vol. 1. Ascomycetes.org vol. 9 fasc. 4 - Ascomycetes.org vol. 14 fasc. 4 & 5.

