



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

***Pseudosperma cf. pseudo-orbatum*** (Esteve-Rav. & García Blanco) Matheny & Esteve-Rav.

Synonyme : *Inocybe pseudoorbata*

Sous pins ou chênes sur sol sablonneux. Chapeau 3,5-8 cm, fibrilleux, blanc puis blanchâtre ivoire à ochracé, avec le centre couvert d'une plaque de voile blanc. Lames rosâtres au départ, rapidement jaune crème. Stipe concolore au chapeau, voilé à fibrilleux de blanc. Odeur nulle ou sans particularité. Spores 12-19 x 6,2-8,5 µm subcylindriques à réniformes. Cheilocystides plus ou moins clavées avec quelques-unes papillées, non cristallifères.

A comparer avec :

- *I. orbata* : bien délicat à séparer, sous cèdres ou chênes, spores un peu plus courtes ;
- *I. arenicola* : plutôt dans les dunes, lames non roses au départ ni jaunes ensuite ;
- *I. obsoleta* : chapeau similaire mais sans plaque de voile blanc, lames pâles sans rose ni jaune, spores un peu plus courtes.

Ce taxon est peu connu, nous remercions Mme Ditte Bandini, spécialiste du genre, de nous avoir mis sur cette piste (sous réserves) à l'occasion de nos récoltes présentées ici, réalisées sous chênes verts et pins à Châtelailillon et Angoulins. Vu le nombre d'espèces proches et difficiles à distinguer, il est évident qu'à l'avenir un séquençage sera impératif pour avancer une identification plus affinée.

Biblio : Osterr. Z. Pilzk. 12 (2003).

*cheilos*



