



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

Pseudosperma umbrinellum (Bresadola) Matheny & Esteve-Raventós

Synonymes : *Inocybe umbrinella*, *I. melliolens* ss. auct.

Sous feuillus. Chapeau fortement strié et fibrilleux de brun-roux contrastant sur le fond pâle. Lames blanchâtres à grisâtres. Stipe blanchâtre, brunissant lentement. Odeur nulle à miellée. Spores 9-15(18) x 6-8 µm. Cheilocystides subcylindriques à clavées, non cristallifères.

A comparer avec plusieurs espèces bien délicates à séparer sans recours au séquençage :

- *P. rimosum* : chapeau normalement plus jaune et spores légèrement inférieures ;
- *P. permelliolens* : chapeau beige jaunâtre avec des fibrilles peu ou moins contrastées ;
- *P. perlatum* : chapeau à centre sombre et spores légèrement inférieures.

Les exemplaires présentés pourraient correspondre au taxon décrit ici, sous toutes réserves, nous les avons observés en juillet 2011, en forêt de feuillus dans le secteur de Fontcouverte.

Biblio : littérature courante - *Inocybe* J. Stangl - DM n° 105 p. 34 - Czech mycology 72(2): 221–250 (2020) - GEPR.