



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

## ***Mycena stylobates*** (Pers.:Fr.)Kummer

Nom français : Mycène à socle

Sur feuilles, plus rarement sur aiguilles et autres débris végétaux. Chapeau 3-10 mm, blanc à grisâtre. Lames blanchâtres. Stipe concolore au chapeau, base typiquement pourvue d'un disque strié à cannelé et cilié au bord. Spores 7-11 x 3,5-5 µm. A comparer par exemple avec :

- *M. mucor* : sur feuilles de chênes, chapeau jusqu'à 4 mm, base du stipe seulement bulbeuse, et en cas de doute la microscopie peut faire la différence ;
- *M. bulbosa* : sur carex et joncs ;
- *M. aciculata* (égal *M. longiseta*) : rare espèce sur débris de feuillus, conifères ou plantes, chapeau grisâtre à gris brunâtre pâle nettement pubescent (loupe) ;
- *M. rhenana* : souvent sur chatons d'aulnes, parfois sur noisettes, glands de chênes ou bogues de châtaignes.

Cette espèce, sans grand problème d'identification, peut se rencontrer à différents moments de l'année, après les pluies ou durant les périodes humides. Nous l'avons observée parfois dès le mois de mai et les mois d'été, mais plus communément l'automne jusqu'en novembre.

Biblio : Littérature courante - *Mycena* d'Europa G. Robich

