



Ordre : *Pluteales*

Famille : *Pluteaceae*

## *Volvariella cf. taylori* (Berk.) Singer

Nom français : Volvaire de Taylor

Sur terre nue, parfois dans l'herbe. Chapeau fibrillo-soyeux, gris à beige ochracé, marge blanchâtre une fois développé. Lames blanches puis roses à maturité. Stipe blanc, volve gris olivacé à brunâtre. Spores 5-8 x 4-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes, mais aussi polymorphes.

A comparer avec *V. caesiotincta* et *V. murinella*, mais ces espèces peuvent paraître bien difficiles à distinguer, notamment au vu d'une littérature parfois controversée et avec des synonymies qui peuvent varier d'un ouvrage à un autre.

Nous avons récolté l'exemplaire présenté ici à Bois-Long commune de Bunzac (16), en juin 2008. Il était sur le sol en bordure de chemin en forêt, le chapeau mesurait 4,5 cm. La détermination ne fut pas aisée et aux yeux de certains, serait peut-être encore discutable. Les éléments nous ayant conduit à ce nom sont, le chapeau blanc à centre gris brun, la volve colorée de gris à l'intérieur comme à l'extérieur et les spores largement elliptiques mesurant 6-6,5 x 4-4,5 µm. Nous remercions ici les collègues avec lesquels une assez longue discussion a eu lieu autour de cette récolte.

Biblio : littérature courante - The european species of *Volvariella* (Orton) - GEPR p. 252.

*Fiche réalisée en mai 2016 par Patrice TANCHAUD*