



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Otideaceae*

## *Sowerbyella brevispora* Harmaja

Sur le sol, souvent groupé mais parfois isolé. Apothécie 1-3 cm, hyménium jaune à jaune orangé, face externe subconcolore. Stipe plus ou moins radicant. Présence d'un latex jaune à la cassure. Spores 9-12 x 5-6  $\mu\text{m}$ , elliptiques, biguttulées et finement verruqueuses.

Les deux récoltes que nous présentons ont été réalisées en novembre et décembre 2009, sous *Cupressus macrocarpa*, dans les secteurs de Rivedoux et La Flotte sur l'île de Ré. La première (à gauche) présentait six apothécies serrées les unes contre les autres mesurant 10 mm maximum, alors que pour la seconde (à droite) il n'y avait que deux apothécies non collées, la plus grande atteignant 27 mm. La microscopie fut déterminante, nous avons observé des spores biguttulées, finement verruqueuses, mesurant 11-11,5 x 5,5-6  $\mu\text{m}$ , donc petites pour le genre mais caractéristiques de l'espèce.

Biblio : Harmaja 184 - Moravec, Mycologia Helvetica vol 1 n° 6, 1985, p 427-442 - Medardi p. 267 - bull. SMF 126 (1) p. 17-24 - bull. SMMA 28 p. 18.

*Fiche réalisée en mars 2019 par Patrice TANCHAUD*

