



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Tarzetta catinus (Holmskj. : Fr) Korf & Rogers

Sur terre nue, en forêt, sur les bords de chemins. Apothécies 10-50 mm, en forme de coupe (souvent perforée au fond), hyménium pâle, beige ; marge crénelée en vieillissant. Stipe absent ou légèrement distinct. Asques aporhynques (sans crochet). Spores biguttulées 18,5-24 x 11-13,5 µm (dimensions variables selon les ouvrages), paraphyses simples. Les taxons de ce genre sont, pour de nombreux mycologues, un véritable casse-tête :

- *T. cupularis* : généralement de plus petite taille, plus gracile, souvent avec un stipe grêle bien individualisé, spores plus larges (13-15,5 µm, mais dimensions là aussi variables selon les ouvrages ...) ;
- *T. spurcata* (syn. *T. ochracea*) : paraphyses souvent renflées à l'apex puis lobées et branchues ;
- *T. pusilla* : apothécies 5 mm maximum, sessiles, et *T. gaillardiana* : apothécies 8 mm maximum, stipitées.

A noter l'existence du genre *Arpinia*, dont les espèces sont fort ressemblantes et rares, qui se distingue par la base des asques pleurorhynque (avec crochet) ; par exemple *A. fusispora* qui possède des spores plus petites et plus fusiformes que chez les *Tarzetta*.

Les contradictions et les caractères croisés étant nombreux dans la littérature, nous suivons M. H.-O. Baral pour tenter de nommer nos récoltes, qui sont assez nombreuses et réalisées généralement entre les mois d'avril et d'octobre.

Biblio : littérature courante - BK1 63 - Ascomiceti d'Italia G. Medardi - DVD H.-O. Baral.

Fiche réalisée en avril 2017 par Patrice TANCHAUD