



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## ***Cortinarius decipiens var. atrocoeruleus*** (M.M. Moser) H. Lindstr.

Synonymes : *C. atrocoeruleus*, *C. sertipes*

Surtout sous bouleaux, parfois sous saules, peupliers ou chênes. Chapeau hygrophane, brun-rouge à brun-noir, brun-jaune en séchant, marge appendiculée de voile blanc. Lames jaunâtre beige parfois nuancées de violet. Stipe voilé de gris luisant à gris brunâtre, parfois violet au sommet. Chair blanchâtre, plus ou moins lilacine au sommet du stipe. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7-8,5 x 4,5-5,5 µm.

Voir la fiche de *C. cohabitans*, taxon proche.

Cette variété diffère du type par la présence de voile sur le chapeau et ses spores plus petites. Nous la connaissons dans le secteur de Cadeuil, au long des chemins avec bouleaux à proximité. Il est aisé de constater ici la variabilité de ce taxon, plus ou moins sombre avec plus ou moins de voile, ce qui peut laisser entendre que parmi les nombreuses espèces gravitant autour de *C. decipiens*, quelques-unes sont probablement superflues, citons par exemple *C. fraternus* dont les différences sont bien difficiles à trouver.

Biblio : ADC Bidaud et al.