



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius flavovirens* R. Henry

Sous feuillus sur sol calcaire, surtout sous chênes, hêtres et charmes. Chapeau visqueux, brun-jaune à olivâtre. Lames jaune grisâtre à gris olivâtre. Stipe grisâtre à jaunâtre avec bulbe marginé, voile jaune-vert. Chair grisâtre à jaune-vert. Odeur farineuse, surtout à la coupe ; saveur farineuse. KOH brun olivâtre au centre du chapeau et acajou vers la marge, ocre rosé sur la chair. Spores 9-10,5 x 5-6  $\mu\text{m}$ . Avec une réaction rouge pourpré au KOH et sans odeur, voir *C. xanthochlorus*.

Ce cortinaire peut paraître délicat à déterminer tant de nombreuses espèces de cette section *Laeticolores* peuvent se ressembler, mais l'odeur farineuse, rare dans ce genre, met rapidement sur la voie. Il est fréquent dans notre région, généralement l'automne, mais parfois dès le mois d'août lorsque les conditions sont favorables.

Biblio : ADC Bidaud et al. - GEPR p. 706.

Fiche réalisée en juillet 2016 par Patrice TANCHAUD



