



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius assiduus Mahiques, Ortega & Bidaud

Synonymes : *C. saturninus* var. *bresadolae* (nom inval.), *C. confirmatus* asp. *assiduus*

Surtout sous chênes verts. Chapeau mamelonné, lisse et brillant, hygrophane, brun-rouge sombre à brun châtain, palissant en brun ochracé. Lames crème lilacin, rapidement ochracées puis brun rouille. Stipe plus ou moins violacé au sommet, blanc argenté ailleurs sur fond brunâtre. Chair crème grisâtre à ochracée, lilacine au sommet du stipe et dans le cortex. Odeur et saveur sans particularité. KOH châtain sombre à noirâtre sur cuticule et chair. Spores 7-9 x 4-5 µm.

Ce cortinaire n'est pas rare sous nos chênes verts, surtout sur le littoral (îles de Ré et d'Aix, Meschers ...), et parfois à l'intérieur des terres (St Savinien). A ce jour nous l'avons observé entre les mois de novembre et d'avril.

Biblio : Fungi non delineati 41/42 - Bull. FMBDS 162 (2001) - ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD

