

Marennnes, oct. 2014



Chermignac, oct 2015



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius basillaceus* P. D. Orton

Sur les bords de mares, d'étangs et de fossés humides. Chapeau 2-6 cm, jaune fauve à orangé, jaune en séchant, fibrilleux. Lames espacées, fauve orangé. Stipe orangé ochracé, pourvu d'une zone annulaire blanchâtre crème assez fugace ; mycélium lilas plus ou moins présent, parfois absent. Chair jaunâtre dans le chapeau, orangé safrané dans le stipe. Odeur herbacée à raphanoïde, saveur douce. KOH rouge purpurin à violet sombre sur cuticule et chair. Spores 10-12,5 x 5-7  $\mu\text{m}$ .

Les cortinaires de la section *Hinnulei* ne sont pas toujours faciles à distinguer, celui-ci paraît assez typique par son écologie et son mycélium lilas.

Nous avons plusieurs observations se rapportant nettement à ce taxon, il est à noter malgré tout que les spores observées sur la majorité de nos récoltes mesuraient 8,5-10 x 4,5-6  $\mu\text{m}$ .

Biblio : ADC Bidaud et al. hors-série n° 1 planche 7 - GEPR p. 796 (nota).

*Fiche réalisée en juillet 2016 par Patrice TANCHAUD*





Trois récoltes automnales provenant de la forêt de l'Hermitain (79), sur bord de fossé humide avec présence de sphaignes ; l'odeur perçue était nettement celle de rave et les spores mesuraient 8,5-10 x 4,5-5  $\mu\text{m}$ .