



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius obtusus (Fr. :Fr.) Fr.

Nom français : Cortinaire obtus

Sous conifères, surtout sous pins. Chapeau 1-5 cm, très hygrophane, brun rougeâtre sombre, brun-roux orangé, rapidement déshydraté radialement en ochracé pâle pour finir crème blanchâtre. Lames brun-jaune à brun clair. Stipe ochracé à blanchâtre, fibrilleux, souvent tordu et fusiforme. Chair ochracé jaunâtre. Odeur typique d'iode, renforcée après la cueillette durant la déshydratation, saveur douce. Spores 7-8,5 x 4-5 µm.

L'espèce la plus proche semble être *C. acutus*, elle se distingue par son « allure de *Galerina* » avec un chapeau ne dépassant pas 15 mm et pourvu d'un mamelon pointu. A noter également l'existence de *C. jubarinus*, espèce moins rapidement hygrophane et inodore, à écologie similaire.

Ce cortinaire est fréquent sous les pins de la région, notamment sur sol sablonneux, sur le littoral comme à l'intérieur des terres, nous le rencontrons l'automne et lors d'hivers doux.

Biblio : ADC Bidaud et al. - GEPR p. 800.

