



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius xanthophyllus (Cooke) Maire

Nom français : Cortinaire à lames jaunes

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau visqueux, lilas pourpré à bleu violacé, puis gris-verdâtre à brun olivacé par le centre, pour finir cuivré pourpré. Lames jaune citrin puis brunes. Stipe jaune verdâtre avec un bulbe marginé. Chair jaunâtre, violacée sous la cuticule. Odeur et saveur sans particularité. KOH rouge sombre sur cuticule, jaune-vert devenant rouge pourpre sur chair. Spores 9-13 x 5,5-7,5 µm.

A noter l'existence de trois taxons de la même Stirps *Xanthophyllus* (Section *Laeticolores*), *C. isis*, *C. corsico-amethytinus* et *C. insignolens*, avec des différences assez ténues, binômes que nous n'avons jamais été tenté de retenir en présence de nos récoltes.

Ce cortinaire n'est pas très fréquent, il se rencontre occasionnellement dans notre région en octobre et novembre.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.- GEPR p. 728.

Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD

