



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius pseudodaulnoyae Rob. Henry & Ramm

Synonymes : *C. daulnoyae* var. *pseudodaulnoyae*, *C. squamosocephalus*

Sous feuillus sur sol calcaire. Chapeau visqueux, violet mauve vif parcouru de fibrilles radiales brun roussâtre, centre décolorant en roux-orangé. Lames argilacées avec un reflet mauve au bord. Stipe blanc, finement fibrilleux, base bulbeuse et en pointe. Chair blanchâtre, violacée vers la marge du chapeau et au sommet du stipe. Odeur terreuse et saveur douce. KOH jaune orangé sur cuticule, jaune sur chair. Spores 9,5-12 x 6-7 μm nettement verruqueuses.

Pour comparaison, voir les fiches de *C. balteatocumatilis* et *C. largus*.

Notre récolte a été réalisée en octobre 2008, sous feuillus, dans les bois de Champagne. Elle nous semble avoir suffisamment de traits communs avec la description pour être baptisée du taxon décrit ici.

Biblio : Marchand, planche n° 705 tome 8 (sous le nom de *C. daulnoyae*) - DM 21 (83), 1991 - ADC Bidaud et al. - JEC n° 18, 2016.