



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius daulnoyae Quélet

Synonyme : *C. cumatilis* var. *daulnoyae*

- Synonyme possible : *C. clarobaltoides*

Sous feuillus, surtout sous chênes. Chapeau jusqu'à 7,5 cm, visqueux, couvert de fibrilles innées brun-rougeâtre sur fond mauve, puis rapidement beige rosé, avec le centre roussâtre. Lames blanc crème parfois à peine teintées de lilacin, puis argilacées. Stipe très ferme, blanc puis crème ochracé à base renflée ou subbulbeuse, voile blanc. Chair blanche. Odeur dite de DDT. KOH jaune orangé sur cuticule et jaune sur chair. Spores 9,5-11,5 x 5,5-6,5 µm.

Voir la fiche de *C. balteatocumatilis* pour les espèces proches.

Ce cortinaire est probablement rare, nous l'avons récolté en septembre 2017 dans les bois de Chalais. L'odeur était nettement terreuse et les spores observées mesuraient 10-11 x 5,5-6,5 µm.

Biblio : ADC Bidaud et al. - Journal des J.E.C. n° 18 (2016).

Non *C. daulnoyae* dans Marchand qui présente *C. pseudodaulnoyae*.