



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## *Cortinarius insignibulbus* Bidaud & Moëgne-Loccoz

Sur sol calcaire, sous feuillus ou conifères. Chapeau visqueux, blanchâtre mastic à jaunâtre, un peu flammé de brun. Lames mauve pourpré vif, puis rouillées. Stipe blanchâtre devenant ochracé, violet au sommet, avec une imposante base bulbeuse et marginée. Chair blanche dans le chapeau et le bulbe, lilacine dans le stipe. KOH brun-roux sur la cuticule, rosâtre faible sur la chair, rose vif sur le bulbe. Spores 9-11,5 x 5-6  $\mu\text{m}$ .

Cortinaire de la Section *Calochroi*, d'allure très élancée, à comparer avec les espèces proches, cf. fiches *C. platypus* (taxon le plus ressemblant) et *C. lilacinovelatus*.

Les deux récoltes présentées ici ont été réalisées en novembre et décembre 2016 à Fouras, à noter que celle sur la photographie de gauche a été confirmée suite à étude moléculaire, ce qui prouverait que le chapeau de cette espèce peut être un peu plus coloré que ce qu'il est possible de lire dans la littérature. Voir en page 2 la macrochimie et la microscopie.

Biblio : ADC Bidaud et al.

*Fiche réalisée en novembre 2017 par Patrice TANCHAUD*

