



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

## ***Cortinarius perpallens*** Chevassut & R. Henry

Sous feuillus ou conifères. Chapeau mauve lilacin à lilacin bleuâtre grisâtre, s'ochraçant par la marge pour finir presque totalement sans traces bleutées, finement fibrilleux, avec la marge restant longtemps enroulée. Lames mauve bleuté pâle, puis beige violacé et rouillées à la fin. Stipe bleu violacé, bulbe marginé couvert d'un voile grisâtre. Chair blanche, bleutée dans le cortex du stipe et jaune safrané dans le bulbe. Odeur raphanoïde parfois faible. KOH nul. Spores 8,5-10,5 x 4,5-6 µm.

A comparer avec quelques espèces ressemblantes également inertes à la potasse :

- *C. terpsichores* : chapeau rapidement ochracé au centre (ochracé par la marge chez *C. perpallens*) ;
- *C. caerulescens* : chapeau moins violet porteur de restes de plaques de voile blanc jaunâtre ;
- *C. eucaeruleus* : chapeau plus vivement coloré de bleu-violet, bulbe ourlé de voile bleuté, spores un peu plus grandes ;
- *C. mairei* : sous pins, chapeau plus grisâtre à centre ochracé.

Nous avons observé ces exemplaires sous chênes dans le secteur de Fouras, la réaction au KOH était nulle sur tous les exemplaires. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage.

Biblio : DM tome 8 fasc. 32 (1978) - ADC Bidaud et al.

