



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius pseudosafranopes Moëgne-Loccoz & Reumaux

En forêt. Chapeau jusqu'à 8 cm, brun-roux à brun orangé avec le centre plus sombre, marge grisâtre, irrégulière, sinueuse et lobée. Lames ocre puis rouillées. Stipe blanchâtre ochracé à brun avec l'âge, voilé de blanc, avec la base fusoïde. Chair crème dans le chapeau et le haut du stipe, safranée dans la moitié inférieure. Odeur et saveur sans particularité. KOH violet pourpre sur chair chapeau et stipe, violet-noir sur la base du stipe. Spores 7-8,5(9) x 5-5,8 µm, très faiblement verruqueuses.

Notre récolte a été réalisée en décembre 2018, sous chênes verts, pins et arbousiers sur l'île d'Aix. Les chapeaux atteignaient 10 cm, les spores mesuraient 8-9 x 5-5,5 µm et paraissaient sans ornementation. L'ensemble des éléments nous ont conduit dans la Sous-Section *Hinnulei*, série *Safranopes*, stirps *Safranopes*, avec deux taxons en concurrence qui montrent des spores à verrues discrètes, celui décrit ici et *C. safranopes* f. *sublaevisporus*, cette forme s'en éloignant par une stature et une couleur de chair différentes ainsi que des spores légèrement plus grandes.

Biblio : ADC Bidaud et al.