



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Thelephoraceae*

Thelephora atrocitrina Quélet

Synonyme : *Phylacteria atrocitrina*

Sur sol en forêt. Fructification noirâtre à la base, d'abord obconique puis se développant en lobes larges, épais, ondulés et mous, à extrémités blanc citrin. Hyménium gris noirâtre lilacin. Spores 8-13 x 6,5-9 µm.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, cette espèce serait synonyme de *T. anthocephala*. Mais pour le moment, nous préférons conserver ce *T. atrocitrina* à part, n'ayant pas observé sur le terrain d'exemplaires intermédiaires (ou évoluant vers la description de *T. anthocephala*) et pouvant nous persuader qu'il s'agit bien d'une seule et même espèce.

Ce champignon ne semble pas fréquent, nous le rencontrons occasionnellement, lorsque les conditions sont favorables l'été et en début d'automne, par exemple sur les bords de chemins en forêt de Port d'Envaux, Villars les bois, Soulignonne, etc.

Biblio : Aphylophorales ... vol. 2 Jülich - Danske Frynsvampe (Thelephora), H. Petersen & Vesterholt - Genere Thelephora in Friuli, G. Zecchin.



