



Ordre : *Rhytismatales*

Famille : *Marthamycetaceae*

## *Naemacyclus fimbriatus* (Schwein.) DiCosmo, Peredo & Minter

Synonymes : *Lasiostictis fimbriata* (Schwein.) Bäumler ; *Coccomyces maritimus* (Rolland) E. Müll.

Apothécies sur aiguilles de pin dégradées, de diamètre inférieur à 1 mm, urcéolées-immérgées dans le substrat. Marge déhiscence en 5 ou 6 dents se soulevant avec la surface du support par temps humide et découvrant l'hyménium gris clair. Face interne de la marge blanc pur contrastant avec la surface externe noire. Asques cylindriques hyalins à sommet remarquablement étiré, 130-150 µm contenant 8 spores, pratiquement de la longueur des asques, septées cylindriques hyalines et parallèles devenant spiralées en se libérant ou dans les asques morts.

Récolte du 13 décembre 2015 sur aiguilles de pin maritime très dégradées dans la forêt de Tousse-Chemise commune des Portes en Ré. Ce champignon évoque l'aspect des *Stictis* ou des *Coccomyces* et ne peut être confondu avec l'espèce très commune du même genre, *N. niveus* (= *Cyclaneusma niveum*) poussant en mélange et qui colonise l'ensemble des aiguilles de pins pendant la saison humide. Ce premier signalement pour la région indique probablement que l'espèce passe inaperçue. Des recherches ciblées permettront une meilleure connaissance de sa répartition.

Biblio : Grelet Les discomycètes de France. Di Cosmo, Peredo & Minter 1983 : European Journal of Forest Pathology 13(4): 207.