



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Zhuliangomyces illinitus (Fr.) Redhead

Synonyme : *Limacella illinita*

Nom français : Limacelle baveuse

En forêt. Chapeau fortement glutineux, blanchâtre à crème rosâtre, sommet légèrement ochracé. Lames blanchâtres. Stipe très visqueux, blanc crème, avec une zone annulaire formant un petit bourrelet assez fugace. Odeur farineuse. Spores 4,5-5 x 4-4,5 µm.

A comparer par exemple avec :

- *Z. marchettii*, cf. publication RMR 2024 (2) : véritable sosie sans réelles différences microscopiques, recours obligatoire à l'ADN ;
- *Z. illinitus* var. *ochraceoroseus* : sous *Cupressus*, chapeau ochracé rosâtre, bien difficile à distinguer à l'occasion de quelques récoltes...
- *Limacella furnacea* : chapeau simplement lubrifié.

Espèce peu fréquente que nous ne rencontrons que très occasionnellement sur le littoral. A noter que suite à la description récente de *Z. marchettii*, de nouvelles observations seront indispensables à l'avenir, avec recours au séquençage, afin de savoir quelle espèce est réellement présente dans la région.

Biblio : littérature courante - RMR 2024 (2) - GEPR.





