

Bouteville (16), sept. 2011



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

Leucoagaricus jubilaei (Joss.) Bon

En forêt de feuillus, parfois mêlée de conifères. Chapeau couvert de fibrilles purpurin améthyste sur fond blanchâtre, centre plus sombre. Lames blanchâtres puis tachées de brunâtre. Stipe blanc, brunissant, anneau fragile. Cheilocystides clavées à subfusiformes. Spores 6-8 x 3,5-4,5 µm. Nous reprenons ici une formule de M. Jacques Guinberteau qui la surnomme la « lépiote aux 4 couleurs » :

- cuticule : jaunissement parfois fugace pouvant passer inaperçu (selon l'hygrométrie), virant à l'orangé puis au brun orangé pour finir brun noirâtre ;
- lames : rougissement au toucher (sans jaunissement préalable) ;
- stipe : jaunissement à la manipulation virant rapidement en rouge-orangé (surtout la moitié inférieure) puis en brun-noir ;
- réaction à l'ammoniaque : vert intense.

A comparer surtout avec *L. babosiae* : chapeau rose purpurin, rougit (sans jaunir) puis brunit, cheilocystides avec col.

Cette espèce n'est pas fréquente, nous la récoltons occasionnellement en forêts de feuillus ou forêts mêlées, sur le littoral comme à l'intérieur des terres, parfois dès l'été, sinon l'automne ou plus tardivement en saison.

Biblio : DM HS n° 3 p. 106.







