



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe cf. lilacinomaculata E. Ludw. & I.L. Franzén

Surtout sous conifères. Chapeau soyeux, conique ou mamelonné, lilacin à centre jaune. Lames blanchâtres à gris ochracé. Stipe lilas parfois lavé de jaune. Spores 8-10 x 5-5,5 µm. Cheilocystides et caulocystides métuloïdes.

Ces inocybes lilacins ou violacés, regroupés jusqu'à présent sous *I. geophylla* var. *lilacina* ou var. *violacea*, sont toujours en cours d'étude. Citons malgré tout quelques taxons qui ressortent, *I. euviolacea*, *I. ionolepis*, *I. tyrii*, *I. syringae*, *I. aphroditeana*, mais est-il possible de les distinguer avec certitude sans étude ADN ? A noter que le binôme *I. lilacina* serait une espèce du continent américain.

Selon quelques informations reçues, l'inocybe violacé que nous observons souvent et en grand nombre sous nos pins, pourrait être *I. lilacinomaculata*, il sera intéressant d'étudier de nouvelles récoltes de près et obligatoirement de séquencer quelques échantillons, de manière à voir quelle(s) espèce(s) existe(nt) réellement dans notre région...

Biblio : Pilzk. 4, E. Ludwig - Mycologia Bavarica Band 22:31-138, Bandini, Oertel, Eberhardt, 2022 - GEPR.

Fiche réalisée en septembre 2026 par Patrice TANCHAUD