



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae


Inocybe cf. aphroditeana Bandini & G. Bandini

Sous feuillus, souvent sous bouleaux. Chapeau soyeux, fibrilleux, conique ou mamelonné, lilas violet intense, parfois avec des tons rougeâtres. Lames blanchâtres à gris brunâtre. Stipe violacé. Spores 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides et caulocystides métuloïdes.

De tels inocybes aux teintes soutenues étaient encore récemment nommées *I. geophylla* var. *violacea*, les choses ne sont pas si simples, des études génétiques ont démontré qu'il existe en réalité plusieurs espèces quasiment impossibles à distinguer sans avoir recours à cette science, citons *I. lilacinomaculata* (binôme que nous avons provisoirement adopté pour remplacer *I. geophylla* var. *lilacina*), *euviolacea*, *I. ionolepis*, *I. tyrii*, *I. syringae*...

Les exemplaires présentés ont surtout été observés dans des milieux frais ou sur bords de chemins sous feuillus, à la période automnale, par exemple à Saintes et St Sornin. Le binôme choisi ici est sous réserves, nous ne manquerons pas à l'avenir de procéder à une étude ADN de quelques échantillons afin de tenter d'y voir plus clair sur les espèces qui pourraient exister dans notre dition.

Biblio : Mycologia Bavarica Band 22:31-138, Bandini, Oertel, Eberhardt, 2022 - GEPR.



cheilos



caulos