



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inosperma adaequatum (Britzelm.) Matheny & Esteve-Rav.

Synonymes : *Inocybe adaequata*, *I. jurana*

Nom français : Inocybe du Jura

Sous feuillus, sur sol calcaire. Chapeau 4-10 cm, fibrilleux à vergeté, brun vineux sombre. Lames blanchâtres puis brunes. Stipe blanc rosâtre à rose vineux. Odeur forte, fruitée aromatique à vireuse. Spores 10-13 x 6-7 μ m, cystides métuloïdes absentes.

A comparer avec *I. rhodiola*, plus gracile, avec des tons plus ochracé jaunâtre à faiblement rosâtres et une odeur faible.

Cet inocybe n'est pas très fréquent, nous ne le rencontrons de temps en temps à la période automnale, sur différents secteurs en sous-bois ou en bordure de bois sur sol calcaire, sur le littoral et à l'intérieur des terres.

Les connaissances progressent, et il est fort possible que quelques-unes de nos récoltes correspondraient plutôt à *Inosperma vinaceum*, taxon récemment décrit (2020) qui se distingue par des tons nettement vineux. Nous ne manquerons pas de revenir sur cette fiche avec de plus amples informations.

Biblio : littérature courante - Inocybe J. Stangl - DM n°105 p. 33 - GEPR.







