



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Imleria badia (Fr. : Fr.) Vizzini

Synonyme : *Xerocomus badius*

Nom français : Bolet bai

En forêt, sur sols non calcaires. Chapeau visqueux puis sec, marron à brun bai. Pores blanchâtres puis jaune verdâtre, bleuissant à la manipulation. Stipe brun ochracé. Chair blanchâtre bleuissant légèrement à la coupe. Pas d'odeur particulière, saveur douce. Spores 12-15,5 x 4-5 µm.

Il est possible qu'il existe d'autres espèces ou formes ressemblantes, par exemple *I. heteroderma*, mais leur réelle séparation reste à prouver à travers des études biomoléculaires.

Ce bolet est assez bien typé pour être reconnu sans trop de difficultés. Dans la région, il est fréquent dans les forêts de feuillus (souvent avec châtaigniers) ou de conifères, l'été et l'automne, exceptionnellement encore en décembre. A noter que le nom de *Xerocomus badiorufus* a parfois été utilisé pour distinguer des exemplaires au tubes très courts et décurrents, avec des pores non ou peu bleuissants et une chair immuable (cf. par exemple page 3), il semble clair aujourd'hui qu'il s'agit de caractères entrant tout simplement dans la variabilité de l'espèce.

Biblio : littérature courante - *Xerocomus* H. Ladurner & G. Simonini - GEPR.



