




Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Ramsbottomia crechqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Benkert & T. Schumach.

Synonyme : *Lamprospora crechqueraultii*

Grégaire sur le sol. Apothécies 2-5 mm, non stipitées, jaune orangé. Spores 16-18(20) μm (sans l'ornementation), sphériques, couvertes d'épines pointues de 2-3(6) μm . Asques octosporiques avec crochets à la base. Paraphyses pigmentées de jaune orangé.

A comparer avec :

- *R. macracantha* : (distinction pas toujours aisée) spores (18)19-23(25) μm , couvertes de grosses et longues épines pointues de 3-10 μm ;
- *R. asperior* : spores 16-18,5(19) x 15-17 μm , majoritairement subglobuleuses, épines 1,5-4(6) μm ;
- *R. lamprosporoidea* : taxon controversé qui se distinguerait par la présence de poils colorés sur la face externe.

Nous avons rencontré cet ascomycète à plusieurs reprises, en milieux humides, dans les secteurs de Cadeuil et de Montendre ainsi qu'en Charente, entre les mois de mai et de septembre.

Biblio : Boudier icône 404 - Discomycètes de France Grelet p. 194 - Nordic Macromycètes vol. 1 p. 112 - Bull. FAMM 36(2) 2009.

