



Ordre : Amanitales

Famille : Amanitaceae

Zhuliangomyces illinitus* var. *ochraceoroseus (Béguet & Bon) Courtec.

Synonyme : *Limacella illinata* var. *ochraceorosea*

Sous *Cupressus*, sur sol sablonneux. Chapeau visqueux-glutineux, gris ochracé rosâtre à beige rosé vers la marge. Lames blanches à crème rosâtre. Stipe lisse, sec au sommet, et visqueux sous la zone annulaire. Odeur farineuse puis désagréable rappelant le poisson sur les exemplaires âgés. Spores 4,5-5 x 4-4,5 µm.

L'espèce type, *Z. illinitus*, se distingue essentiellement par son chapeau blanc et une écologie moins stricte.

A comparer avec *Limacella furnacea* (et var. *albidoochrascens*), dont les couleurs du chapeau sont variables mais sans teintes rosâtres, avec un stipe sec présentant sous l'anneau des bracelets visqueux colorés.

Cette variété n'est pas fréquente, nous pouvons l'observer dans son écologie de prédilection, occasionnellement sur l'île d'Oléron, et plus souvent sur l'île de Ré où les *Cupressus* sont très nombreux.

Biblio : DM 17 p. 26 - Fungi Europaei, Amaniteae (P. Neville & S. Poumarat) - GEPR.

Fiche réalisée en septembre 2026 par Patrice TANCHAUD