




Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe rufuloides Bon

Sous pins ou feuillus, en milieu sablonneux ou caillouteux. Chapeau brun roussâtre à beige ochracé, fibrillo-vergeté. Lames roussâtres. Stipe subconcolore au chapeau, sommet pruineux. Cheilocystides métuloïdes avec présence de paracystides sphéropédonculées souvent articulées ou en chaînettes. Spores 9-11 x 5-6,5 µm, ovoïdes à sommet plutôt obtus.

Sans vouloir mettre en doute l'existence de quelques taxons proches, nous n'en avons ni les capacités, ni l'expérience, car l'étude de ce genre ne s'arrête pas à quelques récoltes réalisées sur un secteur précis, les limites de quelques-uns semblent malgré tout bien difficiles à cerner. Citons par exemple *I. tarda*, *I. belleri* (syn. variété *sabulosa*), *I. deianae*, et sans ordre précis notons également *I. rufula*, *I. vulpinella*, *I. albovelutipes*, *I. tenuicystidiata* (et var. *meridionalis*), *I. involuta*, *I. tenebricoides* (et f. *velata*), *I. friesi*, *I. griseotarda*, *I. destriata*, *I. nitidiuscula*... La liste pourrait être plus longue mais elle suffit pour comprendre que seule une expérience très solide peut permettre d'approcher certains groupes de ce genre.

Cette espèce semble assez fréquente sur le littoral et à l'intérieur des terres. Les deux photographies ci-dessus présentent une même récolte provenant du secteur de Saintes, dont un exemplaire a fait l'objet d'une analyse ADN. Nous remercions vivement M. Victor Sabet du laboratoire Fongilab à Thun-Saint-Martin qui a procédé au séquençage, ainsi que la SMMA (Société Mycologique du Massif d'Argenson) pour la prise en charge financière.

Biblio : DM n° 108 p. 35.



