



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe furfurea Kühn.

Synonyme : *I. sandrae*

Sous feuillus, dans les pelouses moussues, sur sol calcaire. Chapeau brun, brun-jaune à brun-roux, plus sombre au centre, plus ou moins crevassé craquelé à maturité. Lames beiges puis brunâtres. Stipe plus pâle à subconcolore au chapeau au sommet. Spores 8-10,5 x 4-6 µm. Cheilocystides métuloïdes, fusiformes, à parois peu épaisses et NH₃ négatif. Caulocystides métuloïdes sur tout le stipe.

A noter que chez cet *Inocybe*, il arrive qu'une majorité des cystides aient le sommet non cristallifère, tant sur l'arête des lames que sur le stipe (cf. par exemple page 2).

Cette espèce semble peu fréquente à nos yeux, nous l'avons observée à quelques reprises dans le département, toujours sur terrain calcaire.

Les deux photographies ci-dessus présentent une même récolte provenant du secteur de Saintes, dont un exemplaire a fait l'objet d'une analyse ADN avec un résultat qui fut sans appel. Nous remercions vivement M. Victor Sabet du laboratoire Fongilab à Thun-Saint-Martin qui a procédé au séquençage, ainsi que la SMMA (Société Mycologique du Massif d'Argenson) pour la prise en charge financière.

Biblio : DM n° 108 p.64 - *Inocybe* Stangl - Funga nordica.



