



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinellus verrucispermus (Joss. & Enderle) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Synonyme : *Coprinus verrucispermus*

Sur sol argileux. Chapeau 10-15 mm, brun sombre, puis pâlisant surtout autour du centre, couvert d'un voile granuleux dans la jeunesse. Stipe blanchâtre. Spores 11-17 x 7-9,5 µm, elliptiques à amygdaloïdes, verruqueuses, avec pore germinatif central. Basides bisporiques. Pleurocystides présentes. *C. silvaticus* est proche, il s'en différencie par son chapeau de taille supérieure, ses basides tétrasporiques et l'absence de pleurocystides. Cf. fiche *C. phlyctidospora* pour les autres espèces à spores verruqueuses.

Espèce occasionnelle sur les chemins ou sur le sol un peu humide, rencontrée jusque-là durant les mois d'août et de septembre, dans différents secteurs de Charente-Maritime et Charente.

Biblio : littérature courante - Studies in Coprinus d'Ulje - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin).

Fiche réalisée en septembre 2026 par Patrice TANCHAUD



