



Ordre : *Pezizales* Famille : *Pyronemataceae*

Cheilymenia theleboloides (Alb. & Schwein.) Boud.

Souvent en grand nombre, sur débris végétaux, papier en décomposition, crottin de cheval mêlé de paille, etc. Apothécies 5-10 mm, hyménium orangé à jaune. Spores 15-20 x 9-10,5 µm, faiblement striées longitudinalement lorsqu'elles sont chauffées dans le bleu coton (mais difficile à voir). Marge et face externe recouvertes de poils hyalins peu visibles et parfois rares, à observer avec une forte loupe ou au microscope.
Il est à noter qu'il existe une forme sans poils, nommée *C. theleboloides f. glabra*, qui semble bien difficile à retenir. En effet, nous avons pu contrôler des apothécies totalement dépourvues de poils, et quelques semaines plus tard, provenant de la même station, les poils étaient immanquables sur les apothécies nouvelles. Il paraît donc fort tentant de conclure que la quantité de poils peut être très variable d'une récolte à une autre et tout simplement d'une apothécie à une autre…

Cet ascomycète est fréquent sur toutes sortes de supports tels que débris végétaux, paille pourrie, fumier de vache, fumier de poule, résidus de vendanges… Nous l'avons observé tous les mois de l'année sauf l'été de juillet à septembre (période trop sèche). Un contrôle microscopique est néanmoins indispensable afin d'observer les poils et les spores.

Biblio : BK1 88 - Ascomiceti Medardi p. 27 - A world monograph of the genus Cheilymenia J. Moravec.

Fiche réalisée en mai 2025 par Patrice TANCHAUD

C. theleboloides et C. rubra en mélange