



Ordre : *Amanitales* Famille : *Amanitaceae*

Amanita ceciliae (Berk. et Broome) Bas

Synonymes : *A. strangulata, A. inaurata*

Nom français : Amanite étranglée

Sous feuillu sur sol plutôt calcaire. Chapeau brun jaunâtre à brun olivâtre garni d'écailles plates ou pyramidales grises. Lames blanches. Stipe pelucheux de gris souris. Volve grise très fragile. Spores 10-14 µm, globuleuses à subglobuleuses.
A comparer avec *A. meridiocéciliae*, véritable sosie de répartition méditerranéenne, qui noircit légèrement au toucher.
A noter l'existence d'*A. inaurata f. royeri*, qui distingue les récoltes à chapeau gris cendré noirâtre (cf. probablement la photographie ci-dessus à droite).

Cette amanite peut se rencontrer presque tous les ans, à ce jour nous avons noté sa présence entre les mois de juin et d'octobre.
A l'avenir, à l'occasion de nouvelles récoltes, sachant que nous avons des espèces méditerranéennes sur notre littoral atlantique, et vu la publication récente d'*A. meridiocéciliae* (2023), nous devrons être prudent en ayant probablement recours à une étude phylogénique pour aider à trancher.

Biblio : littérature courante.

Fiche réalisée en octobre 2026 par Patrice TANCHAUD









