




Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Pseudosperma flavellum (P. Karst.) Matheny & Esteve-Rav.

Synonyme : *Inocybe flavella*

Souvent sous saules en milieu humide. Chapeau conique, fibrilleux et vergeté radialement, jaune à brun-jaune. Lames jaune olivâtre. Stipe jaunâtre à saumoné. Pas d'odeur particulière. Spores 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides cylindriques à clavées.

A comparer par exemple avec :

- *P. hygrophorus* : écologie similaire mais spores plus allongées et réniformes ;
- *P. squamatum* : chapeau squamuleux ochracé ;
- *P. curreyi* : chapeau squamuleux avec le centre brun rougeâtre.

Les critères pour distinguer les inocybes du groupe des *Rimosae* jaunes ne font pas toujours l'unanimité, nous espérons « limiter les dégâts » en ayant pris soin d'en discuter avec des collègues bien informés sur ce genre. Nos récoltes s'étalent de l'été à l'automne, réalisées en milieux frais ou humides, par exemple dans les secteurs de Saintes, Fontcouverte, La Gripperie St Symphorien et St Bris des Bois.

Biblio : littérature courante - DM n° 108 p. 64 - Inocybe Stangl.

