







Ordre : *Boletales* Famille : *Boletaceae*

Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. & Curt.) Pilát

Nom français : Bolet à moitié jaune

Isolé ou en touffe, sur sciure, souche et bois pourrissant de pin (rare bolet saprophyte et non mycorhizique). Chapeau visqueux, jaune éclatant puis taché d'orange ou rouillé pourpre. Pores jaunes puis verdâtres, bleuissant rapidement au toucher. Stipe concolore au chapeau. Chair jaune bleuissant légèrement dans le chapeau et sous les tubes. Spores 6-8,5 x 3-4,5 µm.
Une deuxième espèce n'est pas mycorhizique, il s'agit de *B. lignicola* qui pousse sur bois de différents conifères, elle est de plus petite taille, son chapeau est assez variable de couleurs mais de tonalités plus brun orangé à fauve rougeâtre, voire orangé olivâtre, et ses pores sont plus ou moins décurrents.

Ce bolet ne semble pas fréquent, nous l'observons très occasionnellement durant les mois d'octobre et de novembre, autour de souches de pins sur le littoral, particulièrement dans le secteur de la forêt de La Coubre.

Biblio : littérature courante.

Fiche réalisée en octobre 2026 par Patrice TANCHAUD

















