



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Pseudosperma cf. pseudo-orbatum (Esteve-Rav. & García Blanco) Matheny & Esteve-Rav.

Synonyme : *Inocybe pseudoorbata*

Sous pins ou chênes sur sol sablonneux. Chapeau 3,5-8 cm, fibrilleux, blanc puis blanchâtre ivoire à ochracé, avec le centre couvert d'une plaque de voile blanc. Lames rosâtres au départ, rapidement jaune crème. Stipe concolore au chapeau, voilé à fibrilleux de blanc. Odeur nulle ou sans particularité. Spores 12-19 x 6,2-8,5 µm subcylindriques à réniformes. Cheilocystides plus ou moins clavées avec quelques-unes papillées, non cristallifères.

A comparer avec *P. musilii* et *P. mediterraneum*, qui ne semblent distinguables avec certitude qu'en ayant recours à des analyses ADN. D'autres espèces gravitent autour et restent également délicates à séparer, citons par exemple *P. orbatum* (sous cèdres ou chênes, spores un peu plus courtes), *P. arenicola* (plutôt dans les dunes, lames non roses au départ ni jaunes ensuite), *P. obsoletum* (chapeau sans plaque de voile blanc, lames pâles sans rose ni jaune, spores un peu plus courtes)...

Nos deux récoltes ont été réalisées sous chênes verts et pins à Angoulins (ci-dessus et page 2) et Châtelailon (page 3). Une étude ADN a été réalisée, avec un résultat approchant plutôt ***P. mediterraneum*** pour les inocybes de Châtelailon, mais qui méritera d'être affiné ou confirmé à l'aide de nouvelles observations. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage.

Biblio : Osterr. Z. Pilzk. 12 (2003).

cheilos



