



Tricholoma viridilutescens Moser

Ordre : Tricholomatales

Famille : Tricholomataceae

Nom français : Tricholome vert-jaune

En forêt. Chapeau brun olive à jaune grisâtre, marge plus claire un peu jaune orangé verdâtre. Lames blanches plus ou moins teintées de jaune. Stipe blanc teinté de jaune avec la base parfois rosâtre. Odeur et saveur farineuses. Spores 5,5-8 x 4,5-6,5 µm.

Plusieurs tricholomes aux teintes similaires ne sont pas aisés à déterminer, ils appartiennent au groupe de *T. sejunctum* (cf. cette fiche).

Nous renvoyons le lecteur vers l'excellent travail de M. J.-M. Trendel (cf. ci-dessous) qui compare, à l'appui d'études ADN, *T. sejunctum* et *T. rufenum*, avec *T. viridilutescens*, ce dernier se retrouvant scindé en deux taxons proches mais différents, nommés pour le moment « type 1 » et « type 2 », le premier serait plus calcicole lié aux pins et hêtres, le second (synonyme possible *T. sejunctum* var. *coniferarum*) plus acidophile et lié aux sapins et épicéas, tous ces éléments restant encore à contrôler à l'occasion de nouvelles observations.

Ci-dessus, deux récoltes dont les analyses ADN ont démontré que étions en présence du « type 1 » de *T. viridilutescens* :

- à gauche : forêt de Chizé, sous majorité hêtres, chênes et pins. Nous remercions le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage, et M. Jean-Michel Trendel pour ses conseils toujours très précieux.
- à droite : Meschers sous chênes verts et pins. Nous remercions M. Victor Sabet du laboratoire Fongilab à Thun-Saint-Martin qui a procédé au séquençage, ainsi que la SMMA (Société Mycologique du Massif d'Argenson) pour la prise en charge financière.

Biblio : littérature courante - The Genus *Tricholoma*, Christensen & Heilmann-Clausen - Bull. Soc. mycol. Strasbourg n° 122 (2023), J.-M. Trendel.