




Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Bankeraceae*

Hydnellum cristatum (Bres. ex G.F. Atk.) Stalpers

Synonymes : *Hydnum cristatum*, *Sarcodon cristatus*

En forêts de feuillus, notamment sous châtaigniers. Fructifications arrondies, pulvinées et subéreuses. Chapeau velouté-strigieux, non zoné, jaunâtre ochracé à plus ou moins brunâtre, avec la marge qui reste claire, en période de croissance la surface peut présenter des gouttelettes ambrées. Face inférieure pourvue d'aiguillons décurrents. Stipe peu différencié du chapeau, concolore et souvent garni d'aiguillons. Chair ocre grisâtre, zonée. Odeur farineuse. Saveur douceâtre puis astringente à légèrement piquante selon les exemplaires. Spores 4-6 x 3,5-5 µm, subglobuleuses et bosselées. Boucles absentes.

Initialement nommées *H. compactum*, une étude récente semble démontrer que nos récoltes appartiendraient plutôt à *H. cristatum*, particulièrement celle réalisée à Brigueuil (photographie ci-dessus à gauche) en compagnie de notre ami François Valade qui a procédé à une analyse ADN.

H. compactum (chapeau aux teintes olivâtres et spores moins globuleuses) serait une rare espèce à tendance boréale, mais de nouvelles études seront encore nécessaires pour débrouiller ce complexe d'espèces, auxquelles nous ajouterons pas exemple *H. mirabile*, *H. lundellii*, etc. Les autres photographies présentent des spécimens observés sur une même station dans le secteur de Villars les Bois. Nous remercions vivement M. Victor Sabet du laboratoire Fongilab à Thun-Saint-Martin qui a procédé au séquençage.

Biblio : Journal of Mycology 8(3) : 119 (1902) - Phytotaxa 751 (3) : 197-250 (2026).

Fiche réalisée en août 2026 par Patrice TANCHAUD



