



Ordre : Tulostomatales

Famille : Tulostomataceae

Tulostoma winterhoffii H. Schub et P. Specht

Synonyme : *T. fimbriatum* var. *heterosporum*


Sur terrain sablonneux sec et plutôt calcaire. Endopériidium blanchâtre à ocre. Stipe brun rougeâtre à ochracé brunâtre, squamuleux. Péristome fimbrié puis denticulé. Spores 4,5-9 µm (dimensions variables caractéristiques), globuleuses à subglobuleuses, couvertes de verruves isolées.

A comparer surtout avec le fréquent *T. fimbriatum*, véritable sosie possédant des spores de 4,5-6 µm à verrues denses réunies en crêtes subréticulées.

Cette récolte a été réalisée en décembre 2023 sur l'île d'Aix, sur un bord de route. Les espèces de ce genre sont très nombreuses et souvent difficiles à distinguer (et dans le cas présent probablement trop souvent baptisées *T. fimbriatum*), ce qui nous a incité à procéder à une analyse ADN. Bien nous en a pris avec un résultat qui fut sans appel, permettant ainsi de prouver l'existence de ce tulostome dans la région. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire.

Biblio : Clé des gastéromycètes épigés d'Europe, 2ème édit. 2003, édit. FAMM.

Fiche réalisée en septembre 2026 par Patrice TANCHAUD



**Spores bleu coton
eau**

