



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe cf. albovelutipes Stangl

Surtout sous conifères. Chapeau 3-5(7) cm, ochracé grisâtre, pelucheux à laineux excorié, avec la marge longtemps voilée de blanc. Lames blanchâtres puis grisâtre ochracé. Stipe subconcolore au chapeau, tomenteux, un peu brunissant avec l'âge ou à la manipulation. Chair blanche, odeur banale. Spores 8-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides à parois minces, remplies de très petites guttules pâles (caractère typique du groupe), pleurocystides similaires. Caulocystides absentes.

Cette récolte (très abondante, une centaine de basidiomes) a été observée en octobre 2024, sous un cèdre sur la commune d'Antornac. Nous avons eu le plaisir d'échanger sur le sujet sur différents forums, il s'avère que la situation n'est pas simple, notamment pour distinguer *I. melanopus* (taxon américain) mais possiblement d'autres espèces qui resteraient à décrire. Nous avons néanmoins demandé une analyse ADN dont le résultat, sans surprise, a conduit à ce groupe d'inocybes. Nous retenons aujourd'hui ce binôme qui, d'avis d'experts, paraît être le plus approprié, avec les réserves d'usage malgré tout, et nous ne manquerons pas de suivre avec intérêt de nouvelles publications.

Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire.

Biblio : littérature courante - Cetto n° 2694 - Inocybe J. Stangl - DM n° 108 p. 16.

