



Ordre : Tricholomatales

Famille : Tricholomataceae

Paralepista inversa (Fr.) Raithelh.

Synonyme : *Lepista inversa*

Nom français : Clitocybe inversé des conifères

Grégaire, surtout sous conifères. Chapeau lisse et brillant, beige ochracé, ocre orange à ocre rougeâtre. Lames crème, décurrentes. Stipe blanchâtre ochracé. Spores 3,5-5 x 3-4,5 µm, finement épineuses.

Les publications semblent contradictoires pour évoquer une éventuelle synonymie avec *P. flaccida*, et également *P. gilva* (taxon vraiment à part ?) qui se distinguerait par son chapeau guttulé (cf. ci-dessus et page2). Nous restons dans l'attente de nouvelles études pour espérer y voir prochainement plus clair.

A noter l'existence d'une espèce fort ressemblante (et hautement toxique par son syndrome acromelalgien, les risques encourus sont suffisamment graves pour être signalés ici), *Paralepistopsis amoenolens* (syn. *Clitocybe amoenloens*) à odeur rappelant la fleur d'oranger.

Ce clitocybe est fréquent dans nos forêts de conifères, il pousse souvent en grand nombre à la période automnale, parfois jusqu'en janvier sur le littoral ; il est exceptionnellement visible avant l'été dès le mois de mai.

Biblio : littérature courante - Funga nordica - Pilzk. 1 - GEPR.

