



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

## ***Inosperma fulvum*** (Bon) Matheny & Esteve-Rav.

Synonyme : *Inocybe maculata* f. *fulva*

De préférence sous feuillus hygrophiles. Chapeau 4-8 cm, conique et mamelonné (pouvant rappeler celui des hygrocibes) fibrilleux à rimeux, fauve rougeâtre à brun orangé vif, parfois avec quelques débris de voile blanchâtre au centre. Lames blanches puis beige ochracé. Stipe blanchâtre à jaunâtre teinté de roux. Odeur pouvant rappeler le pain d'épice. Spores 9-12 x 5-6,5 µm (selon description de M. Bon). Cheilocystides clavées non cristallifères.

A comparer avec

- *I. maculatum* : chapeau brun-roux à brun châtain moins vif, voilé de plaques blanches disposées concentriquement et surtout agglutinées au centre ;
- *Pseudosperma hygrophorus* : chapeau brun jaunâtre à olivâtre.

Malgré des différences microscopiques bien ténues pour séparer ce taxon d'*I. maculatum*, nous nous fions aux couleurs vives et surtout à la quasi-absence de voile pour identifier au mieux ces deux récoltes (provenance Plassay et Chizé), d'ailleurs initialement nommées *I. maculata* f. *fulva*, forme ayant été récemment élevée au rang d'espèce, à l'appui d'études génétiques.

Biblio : DM 21 n° 81 : 47 (1991) - Mycologia 112(1): 102 (2019) - GEPR.