



Ordre : *Tricholomatales* Famille : *Pleurotaceae*

Hohenbuehelia thornii Consiglio & Setti

Synonyme : *H. petaloides* ss. auct.

Au sol, dans les milieux secs, aussi dans les dunes. Fructification en spatule, chapeau beige ochracé, gélifié et brillant, souvent plus coloré vers l'insertion. Lames blanches à grisâtres à maturité, serrées et très décurrentes. Stipe latéral et court. Odeur et saveur farineuses. Spores 6,5-8,5 x 5-5,5 µm. Cystides métuloïdes présentes dans les lames et le chapeau.
A comparer avec :
- *H. petaloides* (syn. *H. geogenia*) : généralement dans les bois de feuillus, chapeau en cornet couvert d'un feutrage gélatineux blanchâtre grisâtre ;
- *H. tremula* : sous conifères (également sur les débris de bois), cuticule dépourvue de cystides métuloïdes.


Cette espèce est peu fréquente, nous en avons quelques observations sur le littoral dans le secteur de La Coubre/La Palmyre, à la base d'oyats ou d'autres plantes herbacées. A noter qu'avant d'adopter ce binôme récemment décrit (2017), de telles récoltes étaient nommées *H. petaloides*...

Biblio : Hohenbuehelia & Resupinatus Consiglio & Setti - GEPR.

Fiche réalisée en octobre 2026 par Patrice TANCHAUD






←cutic.
cystides
lames

