



Ordre : *Tricholomatales* Famille : *Pleurotaceae*

Resupinatus applicatus (Batsch) Gray

Sur bois mort de feuillus. Chapeau jusqu'à 2,5 cm, flabelliforme, marge souvent cannelée festonnée, brun à noirâtre entièrement, point d'inseerction hirsute avec des poils grisâtres à gris-brun. Pseudostipe présent (chapeau s'allongeant vers le point d'insertion. Lames noires à arête pâle. Spores 5-6 x 4-5,5 µm, globuleuses. Cheilocystides ramifiées à coralloides mêlées à des formations cristallines.
A comparer avec :

- *R. rouxii* : spores 4,4-5,2 µm, subtilement plus petites ; donc bien difficile à distinguer et il est possible que nos récoltes soient à rapprocher de ce taxon… ;
- *R. trichotis* : plus petit, chapeau régulier avec un tomentum noir à poils raides à l'insertion, absence de pseudostipe.

Ce petit champignon n'est pas rare, nous l'avons observé à de nombreuses reprises dans la région, il est visible tous les ans, sur feuillus, entre septembre et décembre. Néanmoins à l'avenir, un examen complémentaire, voire probablement un recours à l'étude génétique, ne sera pas superflu.

Biblio : littérature courante - Mille et un champignons P. Roux - I generi Hohenbuehelia e Resupinatus in Europa Consiglio & Setti - GEPR.

Fiche réalisée en septembre 2026 par Patrice TANCHAUD