




Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Pyronema domesticum (Sow. : Fr.) Saccardo

Sur places à feu. Fructifications lenticulaires, souvent en troupes, rose pâle à saumon, reposant sur un feutrage mycélien blanc. Il y a deux espèces dans ce genre, bien proches l'une de l'autre, et nous proposons, à la lecture de douze ouvrages de référence, le comparatif suivant :

- *P. domesticum* : apothécies généralement individualisées, rose pâle à saumon, marge pourvue de fins poils hyalins, spores (13)15-19(21) x (7)9-12(13,5) µm, apparition de sclérotés en culture ;
- *P. omphalodes* : apothécies non individualisées mais sous forme de plaques orangé saumoné, absence de poils ou alors très discrets dans la jeunesse, spores 10-15(16,5) x (5)6-9(11) µm et absence de sclérotés en culture.

Nous avons pu remarquer, à l'occasion de nombreuses récoltes, que les dimensions sporales se situaient dans la fourchette basse d'une espèce et haute de l'autre, par conséquent l'aspect macroscopique semblerait parfois primordial.

Sur nos secteurs de prospection, cet ascomycète semble visible chaque année sur les places à feu récentes, avec présence de charbon de bois et pas encore colonisées par les mousses.

Biblio : BK1 117 - Nordic macromycètes vol. 1 p. 112 - Ascomiceti d'Italia Medardi.

